


抗 Srb4 (*S. cerevisiae*) 抗体、ウサギ抗血清、Chlp grade

商品コード	62-007
容量	100 µl
保存	-20 °C 凍結融解を避ける
濃度	N/A
バッファー	0.1%アジ化ナトリウム添加
純度	ウサギ抗血清
抗原	His-tag 全長 Srb4 タンパク質
アイソタイプ	ウサギ IgG
反応性	出芽酵母 Srb4 タンパク質
特記事項	N/A
アプリケーション	1) ウェスタンブロット (1/1,000-1/5,000) 2) 免疫沈降 3) Chlp (Chromatin Immuno-Precipitation)
背景	メディエーターは、転写調節因子に依存しない基本レベルの転写反応、および転写調節因子による転写活性化反応のいずれにおいても重要な役割を果たすタンパク質複合体である。RNA ポリメラーゼ II の最大サブユニットの C 末端に存在する 7 アミノ酸の繰り返し構造 (CTD) に結合し、CTD のリン酸化に伴い解離するという性質を示す。すでに 30 種類にも及ぶサブユニットがその構成成分として同定されているが、細胞内にはサブユニット構成の異なる複合体が複数種類存在するといわれている。 Srb4p はメディエーターサブユニットの一つであり、687 個のアミノ酸残基 (aa) から構成される。
Data Link	SGD SR4B
画像	 図1 抗 Srb4p 抗体を用いたウェスタンブロット法による Srb4 タンパク質の検出 出芽酵母細胞抽出液 抗血清は 1,000 倍希釈して使用 Srb4 タンパク質の分子質量は 78,5 kDa
文献	本製品は未だ論文に使われていない。
※本製品は研究用です。診断および軍事目的に使用することはできません。	